

Nestkast voor grauwe vliegenvangers



Haagse Vogelbescherming

Instructies

Ophanghoogte boven 3 meter.

Bevestiging op (noord- of zuid-) oostzijde in bomen.

Liefst met wat beschutting in de buurt om rustig te kunnen aanvliegen.

Jaarlijks vóór of na het broedseizoen schoonmaken.

Nestkasten jaarrond laten hangen. Worden 's winters vaak als slaappleaats gebruikt.

U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid!

**Haagse Vogelbescherming (HVB) en Vogelopvang “De Wulp”
Heliotrooplaan 15
2555 MA Den Haag**

Contact: info@haagsevogels.nl

Websites: www.haagsevogels.nl en www.vogelopvangdewulp.nl

Giften: IBAN NL 12 INGB 0003 58 61 85

De **grauwe vliegenvanger** (*Muscicapa striata*) is een kleine, onopvallende zangvogel uit de familie van vliegenvangers (*Muscicapidae*). Open loofbossen en gemengde bossen, bosranden met struwelen, parkachtige gebieden en lommerrijke dorpen en boerenerven zijn een prima leefgebied voor grauwe vliegenvangers. Er moet veel ruimte zijn in de kroonlaag om te kunnen foerageren.

Het verenkleed is grijsbruin met een gevlekte kruin en een donkerbruine vleugeltekening zonder wit. Verder heeft de vogel een iets gestreepte borst. Bovendelen dofgrijs gekleurd, de onderdelen vuilwit. Ongestreept met uitzondering van donkere streping op het voorhoofd, keelzijden en de borst. Vrij langgerekt door lange vleugels en lange staart. Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje.

Grauwe vliegenvangers vallen voornamelijk op door hun gedrag: stilzittend vanaf een uitkijkpost (tak, paaltje of prikkeldraad) en vanaf daar vliegende insecten vangend. Met name vliegende insecten zoals vliegen, bijen, wespen, vlinders, kleinere libellen, juffers, maar ook kevers, spinnen en dergelijke; in najaar ook wel bessen. De grauwe vliegenvanger vangt vliegende insecten op zeer karakteristieke wijze door telkens vanaf een uitkijkpost naar een prooi toe te vliegen en hierna weer terug te vliegen naar de uitkijkpost.

Zijn zang is een laag en bescheiden geluid, als een knarsen van een rad.

Grauwe vliegenvangers komen tijdens het broedseizoen in heel Europa voor. Ze broeden in gevarieerde loofbossen, dorpen met oude bomen en kleinschalig agrarisch landschap.

Territoriaal. Mannetje zingt vanaf eind april tot in juli. Broedt vanaf half mei tot soms half augustus, waarbij vaak één, soms twee nesten met 4-5 eieren worden bebroed. Bouwt nesten in scheuren of grote hopen in bomen, in klimop tegen de stam, maar ook tegen schuttingen en gebouwen. Ongeveer 13 dagen later komen alle eieren tegelijk uit, en 12-17 dagen later kunnen de jongen vliegen. Hierna worden de jongen nog 12-32 dagen gevoerd, waarna het ouderpaar aan het tweede nest begint. Vindt het fijn om een open uitzicht te hebben vanuit het nest, en kan geregeld in halfopen nestkasten broeden.

Het is een trekvogel die overwintert in tropisch Afrika. Lange afstandstrekker bij uitstek. Gaat vanaf augustus 's nachts vanuit Europa (en Noord-Afrika) naar Afrika voorbij de Sahara, en overwintert langs de rand van westelijk Afrika en verder zuidelijk. Deze tocht wordt vaak geleidelijk uitgevoerd, waardoor ze soms pas half november aankomen. De terugtrek begint eind februari, maar wederom langzaam zodat de eersten niet voor eind april terug zijn.

In Nederland arriveert de grauwe vliegenvanger in april/mei en in oktober zijn ze praktisch weer verdwenen. (Bron: Wikipedia)