

## Nestkast voor bonte vliegenvangers



## Haagse Vogelbescherming

### Instructies

Ophanghoogte boven 3 meter.

Bevestiging op (noord- of zuid-) oostzijde in bomen. Liefst met wat beschutting in de buurt om rustig te kunnen aanvliegen.

Jaarlijks vóór of na het broedseizoen schoonmaken. Nestkasten jaarrond laten hangen. Worden 's winters vaak als slaappleats gebruikt.

**Steun ons werk met een gift en / of word lid!**

**Haagse Vogelbescherming (HVB) en Vogelopvang "De Wulp"**  
**Heliostrooplaan 15**  
**2555 MA Den Haag**

Contact: [info@haagsevogels.nl](mailto:info@haagsevogels.nl)

Websites: [www.haagsevogels.nl](http://www.haagsevogels.nl) en [www.vogelopvangdewulp.nl](http://www.vogelopvangdewulp.nl)

Giften: IBAN NL 12 INGB 0003 58 61 85

De **bonte vliegenvanger** (*Ficedula hypoleuca*) is een kleine zangvogel uit de familie van de vliegenvangers (*Muscicapidae*). De soort broedt in het grootste deel van Europa en West-Azië. Het is een trekvogel die voornamelijk in West-Afrika overwintert. Het bouwt zijn nest meestal in holtes, bij voorkeur in eiken.

Bij de bonte vliegenvanger is polygynie gebruikelijk, waarbij het mannetje niet in de onmiddellijke omgeving een tweede vrouwtje tracht te veroveren. Na de paringen gaat het mannetje terug naar het eerste vrouwtje en helpt met het voeden van de jongen.

De bonte vliegenvanger voedt zich met geleedpotigen zoals spinnen, mieren, bijen en soortgelijke prooi

De bonte vliegenvanger is een 12- tot 13½ centimeter grote vogel (9 - 15 gram). De snavel is zwart en heeft de brede maar puntige vorm typerend voor insecteneters die hun prooi in de lucht vangen.

In broedkleed is het mannetje zwart van boven en wit van onder, met een grote witte vleugel vlek, witte pennen aan de zijkanten van de staart en een kleine witte vlek op het voorhoofd.

## Haagse Vogelbescherming

Vrouwtjes en juvenielen en mannetjes buiten het broedseizoen hebben dezelfde tekening als de mannetjes tijdens het broedseizoen, waarbij het zwart is vervangen door licht grijsbruin. Het kan moeilijk zijn de soort te onderscheiden van andere zwart-witte vliegenvangers, in het bijzonder de withalsvliegenvanger.

De bonte vliegenvanger broedt in mei-juni. Het nest wordt meestal gemaakt in een holte, hoog in een boom, zoals een oud spechtennest. Maar de soort nestelt ook in nestkastjes met een open voorkant, spouwmuren of een spleet in een klif. Het nest bestaat uit schors, bladeren, grassprietjes en is bekleed met vezels, paardenhaar, en soms met veren.

Het legsel bestaat uit 5 tot 8 lichtblauwe eieren. Het vrouwtje broedt alleen gedurende 13 tot 15 dagen. De jongen vliegen 12 tot 17 dagen na het uitkomen uit. Het mannetje voert het broedende vrouwtje onregelmatig en soms helemaal niet, vooral als het mannetje een tweede territorium heeft waar een ander vrouwtje begonnen is met eieren leggen. Het mannetje voert wel de jongen in het eerste nest en pas als die uitgevlogen zijn, de overgebleven jongen van het tweede nest. Eind juni of begin juli, worden de nesten verlaten en leiden de ouders hun jongen weg van hun geboorteplaats.

De bonte vliegenvanger heeft een luide, ritmische en melodieuze zang.

Bonte vliegenvangers zijn in Nederland en België minder talrijk dan de grauwe vliegenvanger. (Bron: Wikipedia)